

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

E_3.Μλ3Γ(ε)

ΤΑΞΗ:

Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ:

**ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
/ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**

Ημερομηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 2013

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A.1. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης $f(x) = x^2$ είναι $f'(x) = (x^2)' = 2x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. (7 μονάδες)

A.2. Να ορίσετε το **σταθμισμένο αριθμητικό μέσο** ή **σταθμικό μέσο** για τις τιμές x_1, x_2, \dots, x_v ενός συνόλου δεδομένων που έχουν διαφορετική βαρύτητα και η οποία εκφράζεται με τους λαγόμενους συντελεστές βαρύτητας w_1, w_2, \dots, w_v . (4 μονάδες)

A.3. Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A λέγεται συνεχής;

(4 μονάδες)

A.4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η προταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

a) Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο A και $g(x) \neq 0$ για

κάθε $x \in A$ τότε ισχυει ότι: $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{g(x)f'(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2}$, για κάθε $x \in A$

β) Ο συντελεστής μεταβλητότητας CV παριστάνει ένα μέτρο απόλυτης διασποράς και όχι ένα μέτρο σχετικής διασποράς.

γ) Η διάμεσος δ ενός δείγματος ν παρατηρήσεων είναι πάντα μία από τις παρατηρήσεις.

δ) Το ενδεχόμενο «**Διαφορά του B από το A** » πραγματοποιείται όταν πραγματοποιείται το A αλλά όχι το B .

ε) Δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα είναι ασυμβίβαστα.

(2X5 μονάδες)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

E_3.Μλ3Γ(ε)

ΘΕΜΑ Β

Ο χρόνος αναμονής σε \min των μαθητών ενός σχολείου στη στάση του λεωφορείου έχει ομαδοποιηθεί σε 5 κλάσεις ίσου πλάτους. Το εύρος είναι $R = 20 \text{ min}$, η κεντρική τιμή της τρίτης κλάσης είναι 10 min , 3 μαθητές περιμένουν λιγότερο από 4 min , 20 μαθητές λιγότερο από 12 min , το 84% περιμένουν χρόνο λιγότερο από 16 min , $N_s = 50$ και $F_2 = 0,2$.

B.1. Να αποδείξετε ότι το πλάτος c της κάθε κλάσης είναι 4 και να μεταφέρετε στο τετράδιο σας σωστά συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα

| χρόνος σε min | x_i | v_i | N_i | f_i | F_i | $F_i \%$ |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| [...,...) | | | | | | |
| [...,...) | | | | | | |
| [...,...) | | | | | | |
| [...,...) | | | | | | |
| [...,...) | | | | | | |
| Σύνολο | | | | | | |

(8 μονάδες)

B.2. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, τη διασπορά και τη διάμεσο του χρόνου αναμονής των μαθητών του δεήγματος

(7 μονάδες)

B.3. Θεωρούμε ότι όλοι οι χρόνοι των μαθητών είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι σε κάθε μία από τις παραπάνω κλάσεις. Επιλέγουμε έναν μαθητή στην τύχη και θεωρούμε τα ενδεχόμενα:

A: ο χρόνος αναμονής του μαθητή είναι μικρότερος από 10 min

B: ο χρόνος αναμονής του μαθητή είναι τουλάχιστον 8 min και λιγότερος από 17 min

a) Να βρείτε τις πιθανότητες $P(A)$ και $P(B)$

(5 μονάδες)

b) Να βρείτε τις πιθανότητες $P(A \cup B)$, $P(A - B)$, $P((A \cup B) - A)$.

(5 μονάδες)

ΘΕΜΑ Γ

Θεωρούμε μια μεταβλητή X η οποία μετράει σε $mmHg$ τη συστολική πίεση ενός δείγματος A ν ατόμων μιας πόλης και η οποία ακολουθεί περίπου την **κανονική κατανομή**. Δίνεται ότι η διάμεσος δ της κατανομής είναι $\delta = 13 \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{5x - 5}{2\sqrt{x+3-4}} \right)$ σε $mmHg$ και ότι το 84 % του δείγματος έχει συστολική πίεση μεγαλύτερη από 125 $mmHg$.

- Γ.1.** Να βρείτε τη μέση τιμή \bar{x}_A , την τυπική απόκλιση s_A του δείγματος A και να εξετάσετε αν το δείγμα A είναι ομοιογενές.

(8 μονάδες)

- Γ.2.** Έστω ότι για το δείγμα A ισχύει ότι $\bar{x}_A = 130 mmHg$ και $s_A = 5 mmHg$. Ένα δεύτερο δείγμα B, επίσης ν ατόμων, παρουσιάζει συστολική πίεση $y_i = x_i + 10 mmHg$, για κάθε $i = 1, 2, \dots, n$, όπου x_i η συστολική πίεση των ατόμων του δείγματος A.

- a) Να βρείτε τη μέση τιμή \bar{y}_B , την τυπική απόκλιση s_B και να συγκρίνετε ως προς την ομοιογένεια τα δύο δείγματα.

(7 μονάδες)

- b) Αν επιπλέον το πλήθος των ατόμων του δείγματος A, των οποίων η συστολική πίεση παίρνει τιμές στο διάστημα $(\bar{x}_A + s_A, \bar{x}_A + 2s_A)$, είναι 540,

- i. να βρείτε το μέγεθος ν του δείγματος A.

(5 μονάδες)

- ii. Να βρείτε πόσα συνολικά άτομα και από τα δύο δείγματα έχουν συστολική πίεση κάτω από 135 $mmHg$.

(5 μονάδες)

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{ax^2 + 1}$, $x \in \mathbb{R}$, με $a > 0$, και η εφαπτομένη

(ε) : $y = -\frac{1}{2}x + \beta$ στο σημείο $A(1, f(1))$ της γραφικής της παράστασης.

- Δ.1. a)** Να δείξετε ότι $\alpha = \beta = 1$.

(5 μονάδες)

- b) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

(5 μονάδες)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

E_3.Μλ3Γ(ε)

- Δ.2.** Θεωρούμε τα ενδεχόμενα A , B , Γ , ενός δειγματικού χώρου Ω , που οι πιθανότητες των ενδεχομένων του δίνονται από τις τεταγμένες y , σημείων (x, y) της εφαπτομένης (ε) .

- a) Για τις τετμημένες x των παραπάνω σημείων (x, y) , να αποδείξετε ότι $0 \leq x \leq 2$.

- β) Έστω τα σημεία $K\left(\frac{2}{5}, y_1\right), M\left(\frac{4}{5}, y_2\right), N\left(\frac{7}{5}, y_3\right)$ της εφαπτομένης (ε) . Αν οι πιθανότητες των ενδεχομένων $(A \cap B)$, $A \cup B$ και A είναι διαφορετικές ανά δύο και στοιχεία του συνόλου $\{y_1, y_2, y_3\}$, τότε:

i. Να αποδείξετε ότι $P(A) = \frac{3}{10}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$ και $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$

ii. Να αποδείξετε ότι $f(P(A \cap B')) > f(P(A - B'))$

iii. Αν $P(\Gamma) = \frac{3}{10}$ να αποδείξετε ότι $\frac{1}{5} \leq P(B - \Gamma) \leq \frac{1}{2}$

Σας ευχόμαστε Επιτυχία.
Σήμερα και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις